

Manejo de un brote de sarna en una institución

Dra. Emilia Molinero

Agència de Salut Pública de Barcelona

En los últimos años, la notificación de brotes de sarna en instituciones se ha incrementado de forma muy importante y, mayoritariamente, se produce con retraso desde su inicio y con abordajes incompletos que dan lugar a muchos casos evitables.

Un correcto manejo debe iniciarse a partir del primer caso, con una confirmación diligente que permita identificar quienes son las personas a las que debemos considerar contactos de riesgo de este caso y, igualmente importante, quienes son las personas que pueden estar en el origen del mismo.

La coordinación de estas actuaciones debe realizarse desde los Servicios de Vigilancia epidemiológica supervisando el procedimiento para la búsqueda activa de casos, estableciendo los criterios específicos para definir contactos de riesgo y estableciendo el calendario para la aplicación de tratamientos individuales y ambientales o criterios de seguimiento.

La clave del control del brote radica en un abordaje precoz, sincrónico y exhaustivo. Es fundamental tener presente que el control de la transmisión radica en realizar las actuaciones individuales y ambientales de forma sincrónica sobre todas las personas identificadas entre los usuarios de la institución y entre las personas trabajadoras. Para ello, es importante identificar la responsabilidad de la dirección del centro como proveedora de servicios y como empresa e identificar los recursos asistenciales de cada grupo (recursos asistenciales públicos para usuarios y familias y recursos preventivos de la empresa para trabajadores).